

Problema: Distância entre dois pontos

Faça uma função chamada *distancia*, que recebe duas estruturas do tipo *tipoPonto*, que possuem coordenadas *x* e *y*, e retorne a distância entre esses pontos. Lembre-se que para calcular a distância é uma medida que liga um ponto A a outro ponto B, utilizando o Teorema de Pitágoras, ou seja:

$$D = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

```
double distancia( struct tipoPonto pa, struct tipoPonto pb );
```

Cada argumento da função representa, respectivamente:

- O ponto *A* e;
- O ponto *B*.

A estrutura *tipoPonto* deve ser composta obrigatoriamente por:

- Um inteiro chamado **x**, que indica a coordenada no eixo *x* e;
- Um inteiro chamado **y**, que indica a coordenada no eixo *y*.

Entrada

A sua função não fará nenhuma leitura da entrada padrão.

Restrições

A criação de outras funções auxiliares e o uso de outras bibliotecas são permitidos.

Ao enviar a sua solução pro MOJ, envie somente o arquivo com a extensão C com a função exigida do enunciado, as estruturas, a inclusão das bibliotecas utilizadas e as funções auxiliares (caso existam). Não inclua neste arquivo a função *main*.



Saída

A sua função não fará nenhuma impressão na saída padrão.

Exemplos

Exemplo 1

Suponha que *pa* e *pb* estejam preenchidos da seguinte forma:





A função deve retornar:

5.099020

Exemplo 2

Suponha que pa e pb estejam preenchidos da seguinte forma:



A função deve retornar:

5.000000

Author: Sinayra Moreira <sinayra.moreira@unb.br>